



ワクチン	種類	乳児期										幼児期					学童期/思春期								
		生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上		
インフルエンザ菌b型(ヒブ)	不活化			①	②	③						④(注1)													
肺炎球菌(PCV13)	不活化			①	②	③						④		(注2)											
B型肝炎	ユニバーサル			①	②																	(注3)			
	母子感染予防	①	②																						
ロタウイルス	1価			①	②							(注4)													
	5価			①	②	③						(注5)													
4種混合(DPT-IPV)	不活化			①	②							④(注6)					(7.5歳まで)								
3種混合(DPT)	不活化			①	②							④(注6)						(7.5歳まで)							
2種混合(DT)	不活化																				⑥11-12歳 (注8)	11歳 ①	12歳		
ポリオ(IPV)	不活化			①	②							④(注6)						(7.5歳まで)							
BCG	生							①																	
麻疹・風疹混合(MR)	生												①									② (注10)			
水痘	生												①										②	(注11)	
おたふくかぜ	生												①										② (注12)		
日本脳炎	不活化														① ②	③							④9-12歳		
インフルエンザ	不活化																						毎年(10、11月などに)①②	13歳より①	
ヒトパピローマウイルス(HPV)	不活化																						(注13)	小6 ①②③(注14)	中1 中2~ 高1

定期接種の推奨期間
  定期接種の接種可能な期間
  任意接種の推奨期間
  任意接種の接種可能な期間
  添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間
  健康保険での接種時期